

Альтернативные методы кормления



Antoine-Denis Chaudet. Œdipe enfant rappelé à la vie par le berger Phorbas qui l'a détaché de l'arbre (1801), Louvre

Что чувствует мама?

Фрустрация

Чувство вины

Бессилие

Растерянность

Беспомощность



Почему мы ищем альтернативу?



***«Цель любого альтернативного метода
кормления ребенка - это восстановление
полного и непосредственного грудного
вскармливания там, где это возможно»***

Wight, 2001

Критерии выбора альтернативного метода

- Метод не должен вредить ребенку
 - соответствовать возрасту, зрелости, физическому состоянию
- Метод должен способствовать приобретению/сохранению навыка сосания груди ребенком
- Метод не должен навредить лактации
- Метод должен быть удобен для родителей
 - доступное оборудование, которое родители могут приобрести и легко его использовать, мыть и хранить
- Выбор метода зависит от времени, необходимого для восстановления проблем с кормлением

Сцеживание и хранение грудного молока



Возможные способы

- Шприц
- Удлиненный шприц
- Ложка
- Чашка
- Пипетка
- Поильник Хабермана
- Пальцевое кормление
- Докорм у груди



Альтернативные методы для первых дней и небольших объемов

- Пипетка
- Шприц со снятой иглой
 - том числе, по пальцу
 - в том числе, под грудью



Альтернативные методы для первых дней и небольших объемов

■ Чайная ложка

- особенно актуально при кормлении МОЛОЗИВОМ
- может не подойти для активного ребенка



Фото: из видео [Global Health Media Project](https://www.youtube.com/watch?v=NAnXZ3Ts4f8)
<https://www.youtube.com/watch?v=NAnXZ3Ts4f8>

Кормление ребенка из ложки

- Ограничьте движения ручек пеленкой
- Расположите ребенка полувертикально, в локтевом сгибе
- Наберите в ложку чуть меньше половины объема ложки
- Прикоснитесь к губам ребенка ложкой и смочите его губы молоком
- Позвольте ребенку самому пить (лакать) из ложки
 - не заливайте молоко в рот



Кормление из чашки



Кормление из мягкой ложки



Опасения, связанные с кормлением из чашки или ложки

- Риск аспирации
 - наклоните чашечку так, чтобы жидкость прикоснулась к нижней губе ребенка. **Не лейте молоко в рот ребенку!**
 - **медленно и плавно** приподнимайте чашечку так, чтобы уровень жидкости оставался постоянным, чтобы ребенок мог постоянно глотать молоко
 - используйте маленькую чашечку
 - не кормите спящего ребенка, кормите только при проявлении признаков голода
 - не кормите лежащего горизонтально ребенка
 - во время кормления из чашки голова и тело ребенка должны быть стабилизированы
 - посадите ребенка вертикально или полувертикально к себе на колени, поддерживая голову ребенка рукой (эта же рука позади ребенка поддерживает его плечи и шею)
- Риск недоедания
- Не удовлетворяют потребность ребенка в сосании



Пальцевое кормление

- Хорошо работает:
 - перед прикладыванием к груди для перехода с бутылки/накладки на грудь или при отказе от груди
 - для обучения ребенка сосанию, например, при неврологических проблемах
 - для стимуляции сосательного рефлекса, например, при недоношенности





Кормление с помощью системы докорма у груди



Кормление с помощью системы докорма у груди

- При недостатке молока у матери в следствие, например, при дефиците ткани молочной железы (гипоплазии)
- При слабом сосании ребенка, когда требуется дополнительный поток
- Приемный ребенок

Варианты систем



Medela SNS




Lact-Aid Nursing system



Сделанная самостоятельно

Поильник Special Needs (поильник Хабермана)

- Разработан для детей с расщелиной губы и неба, а также для детей с неврологическими заболеваниями
 - изменяет и регулирует скорость подачи молока с учетом возможностей и усилий ребенка
 - реагирует даже на самые слабые попытки сосания
 - помогает в тех случаях, когда малыши не могут создать вакуум



Мониторинг

- Контроль адекватного потребления ребенком объема питания ведется мамой, оценивается специалистом

- **дневник питания**

- объем питания на 1 кормление/ сутки
- контроль мочеиспусканий и дефекации
- контроль веса 1 раз в неделю



Обработка и стерилизация оборудования



Wash hands thoroughly.



- Fill a pot with enough water to cover all parts.
- Bring water to a boil.
- Place parts in boiling water for 5 minutes.

Цена вопроса

- Шприц 20 мл, 1 шт – 3 грн
- Пипетка, 1 шт - 2 грн
- Венозный катетер «бабочка», 1 шт - 2 грн
- Катетер для кормления, 1 шт – 10 грн
- Medela SNS, 1 шт – 1000 грн
- Мягкая ложечка Medela, 1 шт – 700 грн